

～ ご利用の前に、お子さまの体調確認をお願いします ～

✓ 通園・通学先の通園・通学自粛期間は、ご利用をお控えください。

✓ 発熱、咳、嘔吐、下痢、発疹、目の充血・目やになどは、感染する病気も考えられますのでご利用をお控えください ↓↓

発熱	・24 時間以内に 38 度以上の熱が出たとき ・24 時間以内に解熱剤を使用しているとき ・朝から 37.5 度を越えた熱があることに加えて、元気がなく機嫌が悪い、朝食・水分が摂れていないなど全身状態が不良であるとき
下痢	・24 時間以内に 2 回以上水様便があったとき ・腹痛を伴うとき ・食事や水分をとるとその刺激で下痢をするとき ・機嫌が悪い、元気がない、食欲がない、顔色が悪いとき ・下痢と同時に、体温がいつもより高いとき ・朝に、排尿がないとき
嘔吐	・24 時間以内に 2 回以上嘔吐があったとき ・嘔吐と同時に、体温がいつもより高いとき ・食欲がなく、水分を欲しがらないとき ・機嫌が悪い、元気がないとき ・顔色が悪く、ぐったりしているなどの症状がみられるとき
咳、 鼻水	・夜間、しばしば咳、鼻水のために起きるとき ・ゼイゼイ音、ヒューヒュー音や呼吸困難があるとき ・呼吸が早い、少し動いただけで咳が出るなどの症状がみられるとき
発疹	・感染症による発疹が疑われ、医師より登園を控えるよう指示されたとき ・口内炎がひどく、食事や水分が摂れないとき ・発疹が顔面等にある、患部を覆えないとき ・浸出液が多く、他人への感染の恐れがあるとき

✓ お子さまが感染症にかかった場合は、本人の体調回復と、感染拡大防止のため、ご利用をお控えください。

区分	病名	ご利用をお控えいただく期間の目安 ※
第2種	インフルエンザ	発症した後5日経過し、かつ解熱した後3日経過するまで
	新型コロナウイルス感染症	発症した後5日経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
	百日咳	特有の咳が消失するまで、又は適正な抗菌性物質製剤による 5 日間の治療が終了するまで
	麻疹(はしか)	発疹に伴う発熱が解熱後 3 日経過するまで
	風疹(三日ばしか)	発疹が消失するまで
	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日経過し、かつ全身状態が良好になるまで
	水痘(みずぼうそう)	すべての発疹が痂皮(かさぶた)化になるまで
	咽頭結膜熱(プール熱)	主要症状が消失した後 2 日経過するまで
	結核	医師により感染の恐れがないと認めるまで
	髄膜炎菌性髄膜炎	
第3種	流行性角結膜炎(はやり目)	
	急性出血性結膜炎	
	腸管出血性大腸菌(O-157、O-26 など)	
	溶連菌感染症	
	手足口病	
	感染性胃腸炎	
	(ロタウイルス、アデノウイルス、ノロウイルスなど)	
	ヘルパンギーナ	
	RSウイルス	
	マイコプラズマ肺炎	
	伝染性膿痂疹(とびひ)	
	伝染性紅斑(りんご病)など	

※登園許可証明書や療養解除届の提出は求めません。

