

国内におけるワクチン別副反応疑い報告件数（オミクロン株XBB1.5以外のワクチン）

令和6年7月29日現在

ワクチン	副反応疑い報告数 (報告頻度)	重篤報告数 (報告頻度)	死亡報告数 (報告頻度)
ファイザー（総数） (接種者数： 311,466,713 回分)	31,021 (0.0100%)	7,479 (0.0024%)	1,424 (0.0005%)
モデルナ（総数） (接種者数： 89,897,821 回分)	5,643 (44.0000%)	1,350 (0.0015%)	192 (0.0002%)
ノババックス（総数） (接種者数： 350,327 回分)	44 (0.0126%)	13 (0.0037%)	1 (0.0003%)

ワクチン	副反応疑い報告数 (報告頻度)	重篤報告数 (報告頻度)	死亡報告数 (報告頻度)
乳幼児用ファイザー (接種者数： 482,234 回分)	10 (0.0021%)	4 (0.0008%)	1 (0.0002%)
小児用ファイザー (接種者数： 4,383,550 回分)	149 (0.0034%)	41 (0.0009%)	3 (0.0001%)

※「重篤」とは、①死亡、②障害、③それらに繋がるおそれのあるもの、④入院、⑤①～④に準じて重いもの、⑥後世代における先天性の疾病又は異常のものとされているが、必ずしも重篤でない事象も「重篤」として報告されるケースがある。

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、コミナティRTU筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）：令和4年9月20日、コミナティRTU筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.4-5）：令和4年10月13日、コミナティ筋注6ヵ月～4歳用：令和4年10月24日、コミナティ筋注5～11歳用（1価：起源株）：令和4年2月21日、コミナティ筋注5～11歳用（2価：起源株/オミクロン株BA.4-5）：令和5年3月8日、スパイクバックス筋注：令和3年5月22日、スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）：令和4年9月20日、スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.4-5）：令和4年11月28日、ヌバキンピッド筋注：令和4年5月25日）以降の累計報告件数。