

エムネクスパイク筋注の接種を受けた方へ 接種後の注意

接種後は15～30分程度、接種医療機関の施設内でお待ちください。

途中で体調に異常を感じた場合は、ただちに、近くの医師、看護師などに連絡してください。



「接種直後、以下の症状に注意してください」

□ ショック、アナフィラキシー

接種直後～通常30分以内に起こる重いアレルギー反応です。

ワクチン接種後にもあらわれることがあります。

<主な症状>

全 身：冷汗が出る、ふらつき

頭 部：めまい、意識の消失

顔 面：顔面蒼白（そうはく）

口や喉：喉のかゆみ

胸 部：動悸（どうき）、息苦しさ

手や足：手足が冷たくなる

皮 膚：全身のかゆみ、じんま疹

□ 血管迷走神経反射

ワクチン接種に対する緊張や痛みなどをきっかけに誰でも起こりうる体の反応です。

通常、横になって休めば自然に回復します。

<主な症状>

立ちくらみ、血の気がひく、気を失う（失神する）

「接種日以降、以下の副反応に注意してください」

□ 心筋炎、心膜炎

以下のような症状があらわれた場合は、心筋炎や心膜炎が疑われます。

速やかに医師の診察を受け、本ワクチンを接種したことを伝えてください。

<主な症状>

胸の痛み、動悸（どうき）、むくみ、息切れ、浅くて速い呼吸 など

□ 心筋炎・心膜炎以外の主な副反応

注射部位症状：注射した場所の痛み・腫れ・紅斑、

注射した同じ腕側のリンパ節（わきの下、首、鎖骨上あたり）の腫れ・圧痛

全 身 症 状：発熱、頭痛、疲労、筋肉痛、関節痛、吐き気・嘔吐、悪寒

これら以外の症状が副反応として出る可能性があります。

接種後、普段と変わったことがあった場合は、医師に相談してください。

「接種後の過ごし方」

□ 副反応の発現に注意し、いつもと違う体調の変化や異常を感じた場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

□ 注射した部分は清潔に保ってください。

□ 接種当日に入浴することに特別な問題はありません。注射した部位を強くこすらないようにしてください。ただし、接種後に体調が悪い時は、入浴を控えることも検討してください。

□ 接種当日の激しい運動は控えてください。

新型コロナワクチン よくあるご質問と回答

Q1 新型コロナワクチンの接種を受ければ感染予防対策はしなくてよいですか？

A

本ワクチンは新型コロナウイルス感染症の発症を予防するものです。新型コロナワクチンの接種を受けた方も、引き続き、状況に応じた感染予防対策を継続していただくようお願いします。具体的には、場面に応じた適切なマスクの着用、密集・密接・密閉の回避、換気、手洗いや咳エチケットなどに取り組んでください。

Q2 ウイルスのタンパク質を作るもとになる遺伝情報を体に投与すると、将来の身体への異変は心配ありませんか？

A

本ワクチンの主成分であるmRNA(メッセンジャーRNA)は、体内に入ってから数日間で分解され、mRNAの情報が長期に残ったり、遺伝子に影響を与えることはないと考えられています。

Q3 ワクチンの副反応の心配はありますか？

A

ワクチン接種によって、副反応が起きることがあります。気になる症状、いつもと違う体調の変化が認められた場合には、速やかに医師などにご連絡ください。万が一、本ワクチンの接種によって健康被害が生じた場合、定期接種では国による予防接種健康被害救済制度、任意接種では医薬品医療機器総合機構(PMDA)による医薬品副作用被害救済制度が利用可能です。それぞれお住まいの各自治体(市町村)、PMDAにご相談ください。

予防接種健康被害救済制度の
詳しい情報については、
厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。



医薬品副作用被害救済制度の
詳しい情報については、
PMDAのウェブサイトをご覧ください。



Q4 新型コロナウイルスmRNAワクチン接種後にみられることがあるギラン・バレー症候群について教えてください。

A

ワクチン接種との因果関係は分かっていませんが、新型コロナウイルスmRNAワクチン接種後に、筋力が低下するなどのギラン・バレー症候群(GBS)を発症した事例が報告されています。ワクチン接種後に、両手や両足に力が入らない、物がつかみづらい、手足の感覚がにぶくなった、顔の筋肉がまひする、食べ物が飲み込みにくい、呼吸が苦しいなどがみられた場合は、速やかに医師の診察を受け、本ワクチンを接種したことを伝えてください。

Q5 美容などを目的に、過去にヒアルロン酸などの皮膚充填剤を注入(フィラー治療)したことがある方の注入部位周辺にみられる「腫れ」について教えてください。

A

海外において、皮膚充填剤との関連性は分かっていませんが、皮膚充填剤を注入したことのある方が新型コロナウイルスmRNAワクチンを接種した後に、皮膚充填剤を注入した部位の周辺(特に顔面)が腫れたという報告があります。

COVID-19や本ワクチン接種後の注意点などは、モデルナ新型コロナワクチン被接種者向け情報サイトで確認できます。
URL <https://products.modernatx.com/jp/mnexuspike>

